

Tájékoztató az új gastroenterológiai labor vizsgálatokról

ASCA IgG és IgA vizsgálat

A vizsgálat segítségével már korai fázisban kimutathatóak a vérből a gyulladásos bélbetegségekre jellemző antitestek. Az antitestek megjelenése Crohn-betegség jelenlétére utal.

ANCA vizsgálat

Autoimmun betegségek diagnosztikájában van jelentősége a vizsgálatnak. Segít kimutatni az autoimmun vaszkulitiszek különböző formáit.

EMA IgA vizsgálat

A cöliákia autoimmun betegség diagnosztizálásban és utánkövetésében van nagy szerepe a vizsgálatnak, mellyel a transzglutamináz ellen termelődött EMA autoantitesteket mutatjuk ki. Gyermekkori cöliákia esetén a kétféle antitest, a transzglutamináz antitest és az ellene termelődő EMA autoantitest pozitivitása elegendő a diagnózis felállításához, így nincs szükség vékonybél szövettani vizsgálatra!

Széket emésztettség vizsgálat

Ezzel a vizsgálattal a székletből élelmiszer összetevő maradványokat mutatunk ki. Ha a vizsgálattal zsír, fehérje, keményítő nagyobb mennyiségben található a székletben, akkor az emésztési, felszívódási zavart jelez.

Pancreas elasztáz

A vizsgálat székletben található hasnyálmirigy (pancreas) által termelt elasztáz enzimet vizsgálja és ezáltal segít a hasnyálmirigy betegségek diagnosztizálásában. A vizsgálattal már enyhe fokú hasnyálmirigy elégtelenséget is ki lehet mutatni.

Transzferrin szaturáció

A vizsgálattal képet kapunk a transzferrin fehérjék vastelítettségéről, melynek értékét %-ban adjuk meg. Ez segít az esetleges vashiány mértékének meghatározásában.

Prokalcitonin

Bakteriális fertőzés következtében a prokalcitonin nagyobb mennyiségben szabadul fel, így már a fertőzés korai fázisában segít elkülöníteni a bakteriális és nem bakteriális eredetű fertőzéseket.